



FICHES TECHNIQUES VALORISÉES DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET INDUSTRIELLES

La culture du FENOUIL

ITCMI 2010

	البسباس	
	FENOUIL	
	FENNEL	
Nom botanique	<i>Foeniculum vulgare</i>	
Famille:	<i>Ombellifères</i>	
Espèce originaire de la région subméditerranéenne et subatlantique. Plante à feuilles très finement divisées, au pétiole dont on consomme notamment la base charnue comme légume et aux graines utilisées comme aromate. La saveur anisée provient d'une substance appelée anéthol		

I - PLANTE

- Nombre de graines au gramme : 150 à 250
- Température optimale pour la germination : 18-20 °C.
- Cycle végétatif : 80 à 100 jours.
- Dose de semis : 2,5 kg à 3 kg / ha.

II - VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

Doux de Florence, Géant de Mammouth, Perfection, Précoce de Genève, Latina

III - EXIGENCES :

- Aime les sols profonds et souples (sablo argileux) avec une bonne capacité de rétention en eau, bien frais et se réchauffant rapidement.
- pH: 5,5 à 6,5
- Salinité : plante moyennement tolérante 1,92 à 3,20 g / l (3 à 5 mmhos / cm⁻¹).
- Plante sensible au gel

IV- ZONES DE PRODUCTION

Littoral, sublittoral.

V - MISE EN PLACE DELA CULTURE

- Labour 25 à 30 cm.
- Disquage + passage de la fraise rotative.

5.1- SEMIS

Semis direct ou en pépinière.

- **Quantité** : 2,5 kg à 3 kg / ha
- **Profondeur** : 1 à 1,5 cm
- **Ecartement** :
 - Entre les rangs : 0,40 à 0,50 m
 - Entre plants: 0,20 à 0,25 m



- **Densité** : 80 000 à 120 000 plants / ha
- **Période** : de juin à septembre.

5.2 – ENTRETIEN DE LA CULTURE

Binage, buttage, désherbage

5.3 - FERTILISATION

➤ Fumure de fond

Fumure Organique : 30 à 40 t / ha de fumier au labour d'automne.

Fumure minérale : 80 unités de N / ha

110 unités de P / ha

120 unités de K / ha

➤ Fumure de couverture : 2 apports.

50 unités de sulfate d'ammonium après plantation.

30 unités d'ammonitrate avant montaison.



5.4 - IRRIGATION

Plante exigeante en eau **3000 à 4000 m3 / ha**

VI - PROTECTION SANITAIRE

Nématodes : Pratiquer des rotations.

Pucerons verts et noirs : Isolane

Posidor

Teigne: Dimethoate:

Cercosporose : Thiophante

Methyl

Benomyl- Manebe



Herbicides : Promethyne (gisagonhe 50) en pré levée.

Post levée au stade 2-5 feuilles : Protablan (monolite+limror) en rattrapage.

VII – RECOLTE

3 à 4 mois après le semis, en Algérie la récolte se fait manuellement et en vert destiné à la consommation et l'industrie.

Rendement : 20 à 25 t / ha

FTV : LA CULTURE DE FENOUIL (1 HA)
RDT : 150 QX/HA

Opérations	Main d’œuvre			Matériel			Approvisionnement			Total DA
	Nbre J	Coût unitaire	Montant DA	Nbre H	Coût unitaire	Montant DA	quantité	Coût unitaire	Montant DA	
I. Pépinière :										
- Semence	-	-	-	-	-	-	3 kg	2000	6000	6000
S/T	-	-	-	-	-	-	-	-	6000	6000
II. Travaux du sol										
- Epandage du fumier + engrais minéral	0,5	600	300	4	500	2000	10 T	1200	12000	14300
							7 qx	6000	42000	42000
- Labour	1	600	600	8	500	4000	-	-		4600
- Désinfection sol	0,5	600	300	-	,		100 kg	80	8000	8300
- Disquage +hersage	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
- Traçage + billonnage	20	600	12000	-	-		-	-		12000
S/T	22,5	-	13500	16	-	8000	-	-	62000	83500
III. Plantation et entretien :										
- Pré irrigation	1	600	600	-	-		-	-		600
- Semis	10	600	6000	-	-		-	-		6000
- Irrigations	6	600	3600	-	-		2500 m3	4	10000	13600
-Fumure couverture+ binage+désherbage	12	600	7200	-	-		1 qx d’N	6000	6000	60000
- Buttage	15	600	9000	-	-		-	-		9000
-Traitement + produits (fong+insect).	2	600	1200	8	500	4000	-	-	15000	15200
S/T	45	-	27600	8	-	4000	-	-	31000	62600
IV. Récolte et transport :										
- Récolte+lavage+découpage.	15	600	9000	-	-		-	-		15000
- Transport	4	600	2400	20	500	10000	-	-		12400
S/T	19	-	11400	20	-	10000	-	-		27400
Total Général	86,5	-	52500	44	-	22000	-	-	99000	173500